


CIRURGIA DELS DEFECTES DE REFRACCIÓ AMB LÀSER

Els defectes de refracció són la miopia, la hipermetropia i l'astigmatisme aïllat o bé associat amb un dels anteriors.

La correcció d'aquests defectes es pot realitzar amb ulleres, amb lents de contacte o amb cirurgia. Donada l'enorme dependència i inconvenients que les dues primeres opcions poden ocasionar, la cirurgia representa un avanç significatiu en la millora de la qualitat de vida dels afectats.

LÁSIK



INDICACIONS

Totes les persones que pateixen miopia, hipermetropia i / o astigmatisme majors de 21 anys amb dependència de l'ús de correcció òptica (ulleres o lents de contacte) i amb almenys un control d'estabilització del defecte..

TÈCNICA QUIRÚRGICA

Després de l'aplicació d'un col·liri anestèsic es talla una làmina corneal, la qual, un cop aixecada, permet que el làser excímer actuï en més o menys profunditat segons la potència del defecte a corregir. Un cop finalitzat, la làmina corneal és recol·locada al seu lloc i s'adhereix per si sola sense necessitat de donar punts.

POSTOPERATORI

El pacient va al seu domicili pel seu propi peu minuts després de la intervenció, amb els ulls destapats i ja sense ulleres, encara que amb la visió una mica borrosa que anirà millorant amb els dies següents de l'operació.

CURES POSTOPERATORIES

És obligatori no fregar-se els ulls durant els primers dies.

Hauran instilarse uns col·liris antiinflamatoris durant uns dies després de l'operació.