


Centre Oftalmològic Ciutadella

DESPRENDIMENT DE RETINA (DR)

El DR es produeix quan se separen dues de les capes que constitueixen la retina, entre les quals s'interposa un líquid.

Desprendimiento de retina



Ojo con desprendimiento de retina

És una malaltia ocular greu que es sol presentar en edat mitjana o avançada de la vida. Sol ocórrer amb força freqüència, encara que no exclusivament, en persones miops o amb antecedents familiars de despreniment de retina o després de traumatismes oculars.

Si no se tracta pot acabar ocasionant la pèrdua funcional total de l'ull (ceguesa).

SÍMPTOMES

- **Visió de mosques volants:** punts negres que es mouen en moure l'ull.
- **Visió de llampades lluminoses:** és un símptoma de major importància que reflecteix l'existència de traccions sobre la retina. Sol aparèixer quan ja s'ha produït el trencament.
- **Visió d'una cortina negra:** apareix quan ja existeix un despreniment de manera que la consulta a l'oftalmòleg ha de ser immediata.
- **Distorsió en les imatges i disminució important de l'agudes visual.** Aquest símptoma apareix quan la zona danyada és la central de la retina (màcula).

TRACTAMENT

En primer lloc cal fer una exploració completa per veure que extensió té el despreniment, on són els trencaments de la retina que l'han provocat i planificar el seu tractament. Hi ha diferents modalitats que depenen de les característiques del pacient:

* **Cirurgia clàssica:** És una cirurgia en la qual es col·loca un implant de silicona voltant de l'ull per aproximar la retina després a la zona on hauria d'estar adherida i que segueix després d'un tractament habitualment amb fred per produir un segellat de la ruptura que s'ha produït el despreniment.

* **Vitrectomia:** Consisteix a realitzar unes entrades dins de l'ull, s'elimina el gel que té l'ull dins, el vitri, i un cop ja dins es reaplica la retina i es dona un làser endo ocular per produir un segellat de les ruptures que han conduït al despreniment.

En moltes ocasions es col·loca un gas dins de l'ull perquè la retina s'adhereixi d'una forma adequada. Això implica la necessitat de guardar una postura en el post operatori que habitualment sol ser el que més incomoda els pacients operats de despreniment de retina, atès que cal estar cap per avall unes tres setmanes aproximadament fins que desaparegui el gas introduït.