



# HIPERMETROPIA

La Hipermetropia és un problema visual que ens impedeix veure prou nítids els objectes propers.



## CAUSES

En la hipermetropia la imatge visual s'enfoca per darrera de la retina, en lloc de fer-ho directament sobre aquesta. Aquest fenomen físic pot ser d'origen fisiològic, degut a que el globus ocular és massa petit, o d'origen acomodatiu. En aquest cas, el poder d'enfocament dels nostres ulls resulta insuficient.



La hipermetropia amb freqüència està present des de que naixem ja que els ulls són de menor tamany al néixer. Quan aquests acaben el seu desenvolupament, desapareix la hipermetropia. Moltes persones tenen hipermetropies inferiors a 1 diòptria i mantenen una bona visió fins que comencen els signes d'envelliment.

## SÍMPTOMES

Els símptomes de la hipermetropia depenen de l'edat del pacient. Els hipermetrops joves tindran símptomes com mal de cap, picor d'ulls, fatiga ocular i en alguns casos pot aparèixer estrabisme.

En els pacients adults la dificultat per enfocar nítidament els objectes és el principal símptoma.

## DIAGNÒSTIC

A causa de l'elasticitat que tenen els ulls infantils, hi ha molts casos en què la hipermetropia pot passar inadvertida en els reconeixements escolars rutinaris, i és l'observació dels pares i professors la qual pot revelar el problema. És important realitzar revisions oftalmològiques, sobretot en nens a partir dels 4 anys.

En cas de tenir familiars amb aquest problema refractiu, tenim més probabilitat de patir hipermetropia.

## TRACTAMENT

La hipermetropia es compensa amb l'ús d'ulleres o lents de contacte.

La cirurgia refractiva, Làsik o l'implant d'una lent intraocular, són possibles tècniques per a la correcció de la hipermetropia.