


Centre Oftalmològic Ciutadella



IMPLANTACIÓ DE LENT INTRAOCULAR (ICL)



Aquesta tècnica ens permet implantar una lent intraocular de manera permanent per compensar l'error refractiu (miopia, hipermetropia o astigmatisme), conservant el cristal·lí i sense alterar la còrnia.



ICL es una lent que es col·loca dins de l'ull, entre l'iris (part acolorida) i el cristal·lí. Un cop implantada roman indefinidament en ell.



TÈCNICA

La intervenció consisteix a introduir una lent de contacte intraocular flexible entre l'iris i el cristal·lí per una petita incisió, amb anestèsia tòpica (gotes). És indolora i no requereix ingrés hospitalari. Aquesta tècnica és òptima per tractar pacients joves amb gruixos cornials molt petits o amb defectes refractius mitjans-altos (miopia, hipermetropia i/o astigmatisme) que no puguin ser tractats mitjançant la tècnica Làsik (Làser Excímer)

AVANTATGES

- La ICL està dins de l'ull, és invisible i no se sent, pel que l'única manera de saber que està és per la millora de la visió.
- Està pensada perquè quedi indefinidament dins de l'ull encara que, si fos necessari, es pot canviar o retirar ja que no danya les estructures de l'ull.
- Corregeix els defectes refractius per sobre dels límits del tractament amb làser (Làsik).
- Pot tractar dos defectes visuals en un sol pas. Les lents poden corregir l'astigmatisme i la miopia o hipermetropia en un sol procediment. Cada lent es fabrica de forma personalitzada per cobrir les necessitats de cada pacient.
- La satisfacció del pacient amb la lent ICL és molt alta. Proporciona una molt bona qualitat de visió.
- Aquest tipus de lents no es degrada, els materials que fan servir per a la seva fabricació són biocompatibles i per tant no hi ha cap reacció de l'organisme cap a elles.
- La recuperació visual és ràpida.

CURES POSTOPERATORIES

- Al dia següent la visió sense ulleres és molt bona i es pot fer una vida pràcticament normal, evitant fregar-se els ulls i llocs polsegosos per prevenir una infecció.
- Després de la cirurgia, cal instil·lar-se unes gotes antibiòtiques i antiinflamatòries durant uns dies.
- S'ha de fer els controls periòdics que el seu oftalmòleg li indiqui encara que la seva visió sigui bona.