




Centre Oftalmològic Ciutadella

# DESPRENDIMIENTO DE RETINA (DR)

**E**l DR se produce cuando se separan dos de las capas que constituyen la retina, entre las que se interpone un líquido.

Desprendimiento de retina



Ojo con desprendimiento de retina

**E**s una enfermedad ocular grave que suele presentarse en edad media o avanzada de la vida. Suele ocurrir con bastante frecuencia, aunque no exclusivamente, en personas miopes o con antecedentes familiares de desprendimiento de retina o tras traumatismos oculares.

**S**i no se trata puede acabar provocando la pérdida funcional total del ojo (ceguera)

## SÍNTOMAS

- **Visión de moscas volantes:** puntos negros que se mueven al mover el ojo.
- **Visión de destellos luminosos:** es un síntoma de mayor importancia que refleja la existencia de tracciones sobre la retina. Suele aparecer cuando ya se ha producido la rotura.
- **Visión de una cortina negra:** aparece cuando ya existe un desprendimiento por lo que la consulta al oftalmólogo debe ser inmediata.
- **Distorsión en las imágenes** y disminución importante de la agudeza visual. Este síntoma aparece cuando la zona dañada es la central de la retina (mácula)

## TRATAMIENTO

En primer lugar hay que realizar una **exploración completa** para ver que extensión tiene el desprendimiento, donde están las roturas de la retina que lo han provocado y planificar su tratamiento. Existen diferentes modalidades que dependen de las características del paciente:

- **Cirugía clásica:** Es una cirugía en la que se coloca un implante de silicona alrededor del ojo para aproximar la retina desprendida a la zona donde debería estar adherida y que se sigue luego de un tratamiento habitualmente con frío para producir un sellado de la ruptura que ha producido el desprendimiento.
- **Vitrectomía:** Consiste en realizar unas entradas dentro del ojo, se elimina el gel que tiene el ojo dentro, el vítreo, y una vez ya dentro se reapplica la retina y se da un láser endo ocular para producir un sellado de las roturas que han conducido al desprendimiento.

En muchas ocasiones se coloca un gas dentro del ojo para que la retina se adhiera de una forma adecuada. Esto implica la **necesidad de guardar una postura en el post operatorio** que habitualmente suele ser lo que más incomoda a los pacientes operados de desprendimiento de retina, dado que hay que estar boca abajo unas tres semanas aproximadamente hasta que desaparezca el gas introducido.